Grandes Cultures

Champagne-Ardenne

Bulletin n°271 du 29/03/95


d'après les observations des 28 et 29/03/95

Colza

Stade boutons accolés à début floraison. **Méligèthes**

Le vol est stoppé par les conditions climatiques et les parcelles les plus précoces ont dépassé le stade de sensibilité (1ères fleurs).

■ Nos conseils : surveillez régulièrement les colzas les plus tardifs dès le retour du soleil.



Maladies

Rares foyers de cylindrosporiose dans le Barrois de l'Aube. Dans le même secteur, apparition des tout premiers symptômes de pseudocercosporella.

■ Nos conseils : aucune intervention n'est à prévoir.

Blé

Peu d'évolution des stades (épi 1 cm à 2 noeuds) et des maladies.

Maladies

La pression de piétin-verse se confirme (voir notre dernier bulletin). Une visite à vos parcelles (ou le recours à un kit de diagnostic) s'impose pour déterminer si vous devez ou non prendre en compte le risque piétin. L'oïdium et les septorioses sont défavorisés par les conditions météo actuelles.

■ Dans les parcelles à risque piétin: si vous utilisez une spécialité à base de cyprodinil, vous pouvez attendre le stade 2 noeuds. A ce stade, il conviendra sans doute d'y associer une matière active efficace contre les septorioses, surtout sur les variétés sensibles.

Avec d'autres matières actives (triazoles, prochloraze), intervenez au stade 1 noeud. Ces matières actives présentent un niveau d'efficacité satisfaisant sur septorioses. Sur variétés sensibles à l'oïdium, prévoir l'adjonction d'une morpholine.

■ Dans les parcelles sans risque piétin, la faible pression actuelle des maladies du feuillage ne nécessite pas d'intervention immédiate. Il est tout à fait possible d'attendre le démarrage de l'oïdium ou de la septoriose pour placer une intervention.

Ronds "malades"

Dans nos derniers bulletins, nous vous signalions la présence de ronds de quelques dizaines de centimètres. Ces ronds rappellent ceux de la jaunisse nanisante. D'après l'INRA, ils seraient dûs aux pucerons qui ont séjourné pendant tout l'hiver sur les blés. Ces attaques concernent plusieurs variétés: VIVANT, RITMO, BOURBON... Seule une minorité de parcelles est concernée. Visitez particulièrement les champs situés en vallée ou à proximité de bosquets.

■ Des analyses sont actuellement en cours dans les laboratoires de l'INRA. En cas de découverte de tels ronds, contactez votre technicien habituel.

Orge

Maladies

Léger redémarrage de l'helminthosporiose dans le sud de la Marne et l'Aube.

■ Il est encore trop tôt pour traiter.

Jachères

De nombreux appels téléphoniques ont alerté notre laboratoire depuis quelques jours. Des agriculteurs, suite à une traversée d'une parcelle en jachère, ont constaté des perforations très nettes de leurs bottes. Quelques techniciens nous ont également fait part des mêmes phénomènes. A ce jour, aucune dégradation significative sur pneus de tracteur n'a été signalée.

■ Aucune intervention n'est à prévoir. Il

convient néanmoins de rester vigilant. Nous vous tiendrons informé de l'évolution de la situation.





Colza : insectes et maladies bloqués par le mauvais temps.

Blé : maladies freinés par le froid.

Orge : peu d'évolution des maladies



Le point sur

Vigne et hormones ne font pas bon ménage

partir du stade «débourrement», la vigne est extrêmement sensible aux phytohormones employées en désherbage. Précisons le cadre juridique qui régit l'emploi de ces produits en zone de vignoble.

Le texte de référence est l'arrêté du 25 février 1975 dont l'article 2 précise que toute précaution doit être prise pour éviter la dérive d'un produit phytosanitaire vers n'importe quel endroit autre que la parcelle destinée à recevoir le traitement

Pour en revenir concrètement au cas des hormones, l'applicateur sera tenu responsable des dégâts consécutifs à l'entraînement de ces produits vers une parcelle de vigne entrée en période de végétation active.

Cette disposition d'ordre général va donc revêtir un intérêt tout particulier dans le contexte précis du débourrement de la vigne, escompté à partir du 30 mars pour les parcelles les plus hâtives.

\square

Nous recherchons

des parcelles d'escourgeon Plaisant dans le secteur de Reims ou du Tardenois. Contactez MM LEFORT ou LOISEAU au 26.09.06.43

Avez-vous pensé à nous retourner votre bulletin de réabonnement orange?

Dow Elanco SA communique ...

a société Dow Elanco met en garde les agriculteurs contre les risques d'inefficacité et de non sélectivité liés à l'utilisation d'un produit actuellement commercialisé sous la marque STARANE, dont la composition ne correspond ni à l'homologation française de

l'herbicide STARANE 200, ni à la quantité de matière active indiquée sur l'étiquette (180 g/litre et non 200g/litre).


Pour toute information, contacter la société au 16(1).39.66.10.16

Prévision des septorioses

ous reprenons la diffu sion des informations données par le modèle de simulation des septorioses PRESEPT. Par rapport à l'an dernier, nous présentons la situation sous forme d'une carte montrant les niveaux de risques prévus par le modèle pour les 15 à 20 prochains jours. Cette carte vous permet de connaître le risque septorioses pour votre secteur.

Pour vous permettre de mieux juger la situation, un "thermomètre" vous indique la tendance par rapport à des années type à la même date: 1988 (année très forte) et 1984 (année très faible). Par exemple, cette semaine, à l'approche du stade 1 noeud, le niveau de risque prévu par le modèle est inférieur à celui de l'an passé (bien plus faible qu'en 1988 au même stade).

Enfin, un bref commentaire vous aide à prendre vos décisions.



Depuis le début du mois, le niveau de risque septoriose baisse. Il est actuellement très bas (4 dans le pire des cas) et ne remontera pas d'ici la fin de la semaine compte tenu des prévisions de Météo France. Même en cas de remontée non prévue des températures, le risque resterait faible (inférieur à 30) sur la plus grande partie de la région, comme le montre la carte ci-dessus. A suivre ...